

بیمارستان امام خمینی (ره) آباد

ROP (بررسی مشکلات شبکیه چشم نوزاد نارس)



مواردی که شامل غربالگری چشم نوزادان نارس می شود:

وزن تولد نوزاد کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ گرم باشد

هفته بارداری کمتر یا مساوی ۳۴ هفته

سنی که نوزادان نارس باید به چشم پزشک مراجعه کنند:

با توجه به هفته بارداری ممکن است متفاوت باشد ولی بهترین زمان

حدود ۴ هفته پس از تولد می باشد.

علت غربالگری چشم نوزادان نارس:

با توجه به شکل گیری کامل شبکیه ی چشم جنین در هفته های آخر بارداری ممکن است نوزادان نارس دچار نارسی شبکیه

باشند لذا جهت پیشگیری از عوارض نارسی شبکیه از جمله نابینایی مطلق انجام این غربالگری ضرورت دارد.

دلیل معاینه متناوب و دوره ای توسط چشم پزشک:

از آنجایی که بیماری شبکیه نوزادان نارس می تواند پیشرونده باشد، بنابراین در زمان های مشخص توسط چشم پزشک معاینه

می شوند تا در صورت پیشرفت بیماری، در اولین مراحل تشخیص داده شود و درمان شوند.

مدت زمان فاصله بین معاینات دوره ای چشم نوزاد توسط چشم پزشک:

با توجه به معاینات چشم نوزاد توسط چشم پزشک معاینات دوره ای از چند روز تا چند هفته می تواند باشد.

مدت زمانی که معاینات توسط چشم پزشک باید ادامه یابد:

بستگی به معاینه توسط چشم پزشک و نظر ایشان دارد.

چگونگی پاسخ به درمان اختلالات شبکیه چشم نوزادان نارس

در صورت مراجعه به موقع و در صورت تشخیص پزشک و درمان به موقع که شامل تزریق داخل

چشمی یا لیزر می باشد این اختلال قابل درمان است

جهت چگونگی و شرایط مراجعه به درمانگاه ROP در درمانگاه پوستچی شیراز از این لینک استفاده کنید.

۹۳۰۶۰۱۲۵۳۲ شماره یا با تماس بگیرید @clinic_rop1_poostchi

تهیه کننده: زهرا رعیتی کارشناس پرستاری

منبع: دفتر سلامت نوزدان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۴۰۲

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) ۱۴۰۴