

بیمارستان امام خمینی (ره) آبداده

انسداد مجرای اشکی



انسداد مجرای اشکی: اشک چشم موجب مرطوب شدن کره چشم و از طرفی پاکیزه و شفاف نگه داشتن چشم می شود و پس از شستشوی چشم از طریق مجرایی به بینی راه پیدا کرده و به این وسیله تخلیه می شود. اگر به هر علتی این مجرا مسدود شود تخلیه اشک دچار مشکل میشود.

علائم انسداد یا عفونت مجاری اشکی

- ✓ اشک ریزش مداوم از یک یا هر دو چشم
- ✓ خروج مخاط و چرک به جای آب از مجرای اشکی
- ✓ درد، قرمزی و تورم زیر چشم
- ✓ قرمزی سفیدی چشم در اطراف مجرای اشکی

درمان

انسداد مادرزادی مجاری اشکی با میل زدن یا سونداز مجرای اشکی قابل درمان است چنانچه انسداد کامل باشد حتماً نیاز به عمل جراحی برای باز کردن کیسه اشکی و ارتباط دادن آن به بینی نیاز است .

اقدامات قبل از عمل

- قبل از جراحی جهت کاهش خونریزی به بیماران توصیه می شود از مصرف داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین اجتناب کنند.
- همچنین از مصرف داروها و غذاهای گیاهی رقیق کننده خون مانند سیر، زعفران، دمنوش هایی مانند چای سبز، دارچین، ... پرهیز نمایند .
- حداقل دو روز قبل از جراحی باید سیگار کشیدن بیمار قطع شود همچنین مصرف ویتامین A, D, E, K نیز باید محدود شود .
- تا زمان جراحی باید داروهای فشارخون را ادامه داد . افزایش فشارخون می تواند موجب خونریزی شدید حین عمل و ایجاد خونمردگی بعد از جراحی شود.
- روز قبل از عمل حمام کنید.
- اگر سن شما بیش از 40 است، نیاز به نوار قلب و مشاوره بیهوشی دارید .
- انجام آزمایش خون و رؤیت نتیجه آن توسط پزشک بیهوشی الزامی است.
- اگر بیماری خاصی مانند دیابت ، کم کاری و یا پرکاری تیروئید، فشارخون بالا، حساسیت دارویی یا آلرژی به ماده خاصی دارید، حتماً پیش از عمل پزشک بیهوشی و پزشک معالج و پرسنل بخش یا اتاق عمل را مطلع کنید.

➤ داروهای مسکن بجز استامینوفن از دوهفته قبل از عمل نایستی استفاده شوند.

مراقبت پس از عمل جراحی

- شناسایی علائم هشدار (خونریزی از بینی، سر درد به همراه درد چشم) و در صورت مشاهده سریع به اورژانس مراجعه کند.
- توصیه می شود بیماران تا یک هفته پس از عمل استراحت مناسب داشته باشند.
- پس از عمل، (حتی تا یک روز پس از عمل) در هنگام خروج از تخت به آهستگی خارج شوید. ابتدا لبه تخت بنشینید و در صورتیکه دچار سرگیجه نشدید از تخت خارج شوید.
- پس از جراحی از مصرف مایعات داغ تا 12 ساعت اجتناب کنید.
- به دلیل استفاده از داروهای خاص جهت عمل جراحی تا 48 ساعت رانندگی نکنید.
- از طریق دهان عطسه کنید. (در زمان عطسه کردن دو بینی خود را بفشارید).
- تا دو هفته بینی خود را با فشار پاک نکنید و یا از دست کاری بینی خودداری کنید.
- به منظور کاهش تورم و خونریزی از کیسه یخ یا کمپرس سرد در محل برش جراحی حداقل چهار مرتبه در روز تا 2 روز پس از عمل استفاده کنید.
- ممکن است چند روز بعد از جراحی خروج خون از بینی را داشته باشید. در این صورت با فشار دادن و بستن سوراخ های بینی و نشستن در وضعیت عمود به مدت چند دقیقه، خونریزی متوقف خواهد شد. برای جلوگیری از بلعیده شدن خون و کنترل خونریزی در وضعیت نیمه نشسته بخواهید.
- جهت جلوگیری از خونریزی از زور زدن و بلند کردن اشیاء سنگین جلوگیری کنید.
- در صورت بروز خونریزی غیرقابل کنترل با جریان پیوسته به مراکز اورژانس گوش و حلق و بینی مراجعه کنید. قسمت داخلی بینی خود را مرطوب نگه دارید. اگر هوای منزل خشک است از دستگاه رطوبت ساز استفاده کنید.
- از تماس با افرادی که عفونت های تنفسی مانند سرماخوردگی دارند و یا رفتن به مکان هایی که دود یا گردو غبار دارد پرهیز کنید.
- بعد از جراحی داروهایی که به طور معمول استفاده می کنید بخصوص داروهای فشارخون را ادامه دهید. در صورت داشتن درد از مسکن هایی شبیه استامینوفن استفاده کنید.
- از روز سوم پس از عمل، بینی خود را به آرامی با سرم نمکی شستشو دهید.



منبع: کتاب برونر سودارث 2018

تهیه کننده: ژاله دهقانی سوپر وایزر آموزش سلامت

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) 1403