

## بیمارستان امام خمینی (ره) آباد

### دستورات آمادگی لازم برای انجام سی تی اسکن با تزریق



- ❖ متخصص رادیولوژی یا پزشک درخواست دهنده در بخش تصویربرداری بایستی حضور داشته باشد.
- ❖ قبل از اجرای سی تی اسکن با تزریق بایستی آزمایش BUN/CR (اوره - کراتینین) جهت بررسی عملکرد مناسب کلیه انجام شده باشد.
- ❖ در صورت داشتن هر نوع حساسیت و یا ابتلا به بیماری از جمله دیابت، آسم، بیماری قلبی، کلیوی و مولتیپل میلوم به مسئول پذیرش اطلاع دهید.
- ❖ بیماران خانم در صورت باردار بودن، قبل از انجام سی تی اسکن، به مسئول مربوطه و پزشک خود اطلاع دهید.
- ❖ بیمار مدارک بررسی های قبلی (سونوگرافی یا سی تی اسکن و...) را همراه داشته باشد.
- ❖ بیمار قبل از تزریق ماده رنگی حدود 8 ساعت ناشتا باشد.
- ❖ برای سی تی اسکن شکم و لگن دستور داروی رنگی خوراکی بسته به نوع و محل مورد نظر به بیمار داده می شود، به طور کلی 1 آمپول مگلو مین 20-76٪ در یک لیتر مایع ریخته می شود. برای سی تی شکم از 2 ساعت قبل از انجام سی تی اسکن خوردن دارو هر 20 دقیقه یک لیوان توسط بیمار انجام می شود. برای سی تی اسکن شکم و لگن از شب قبل یک لیوان دارو آماده شده به بیمار خورانده می شود و مابقی قبل از انجام سی تی اسکن، هر 20 دقیقه یک لیوان به بیمار خورانده می شود.
- ❖ حتما یک نفر همراه داشته باشید.
- ❖ بدلیل سرمای اتاق سی تی اسکن می توانید یک عدد پتو یا پتوی مسافرتی نیز به همراه داشته باشید.



نهیبه کننده: حمیده اسکندری کارشناس رادیولوژی

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) 1403